



Vaccin: Fluarix intramuskulär inj mot influensa

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inaktiverat trivalent influensavaccin, förfylld spruta

INGEN SPÄDNING

INJ SUSP FÖRF
1 dos
0,5 mL

ADMINISTRERING

Sprutan ska omskakas innan administrering. Vaccinet ska vara en färglös och lite grumlig suspension.

Intramuskulär injektion:

Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fluarix (registrerad produkt)

1 dos, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvara sprutan i ytterkartongen, ljuskänsligt. Om avvikelser från kylskåpsförvaring sker är vaccinet stabilt i 72 tim i upp till 25 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Preexpositionspylax mot influensa

Barn 6 mån - 18 år: engångsdos 0,5 mL

Barn 6 mån - 8 år som tidigare inte har fått influensavaccin ska få en andra dos efter ett intervall på minst 4 veckor.

ÖVRIG INFORMATION

Fluarix är ett inaktiverat vaccin och kan ges i kombination med andra inaktiverade vacciner och/eller levande försvagade vacciner (även orala). Se även referens Janusinfo.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Folkhälsomyndigheten Vaccination mot influensa

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationer-i-sverige/influensa/>

Janusinfo Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5477

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-10-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT