



Fluvoxamin oralt

(Fevarin) tabletter

Risk för nyttillkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till barn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 50 mg och 100 mg (Fevarin)

ADMINISTRERING

Oralt:

Får inte tuggas. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

För doser på 12,5 mg, se Vanlig indikation och dos.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

Tabletten är svår att krossa. Vid ofullständig krossning kan delar av drageringen orsaka stopp i tunn sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fluvoxamin (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatri.

Ges kvällstid i första hand, för att minska risken för biverkningar.

Doser över 50 mg/dygn ska delas upp i morgon- och kvällsdos.

Tvångssyndrom och/eller

Ångestsyndrom (1:a handsval)

Barn 8 - 11 år: Startdos 12,5 - 25 mg x 1

Kan trappas upp med 12,5 - 25 mg/dygn varannan vecka till max 200 mg/dygn.

Tabletterna är enligt produktresumén inte delbara i jämna delar ner till 12,5 mg.

Vid behov av startdos 12,5 mg, dela 50 mg tablett i 4 delar och administrera en fjärdedel per dag, dagarna efter varandra.

Alternativt kan upptrappning ske med 25 mg VARANNAN dag.

Barn 12- 18 år: Startdos 25 mg x 1

Kan trappas upp med 25 mg/dygn varannan vecka till max 200 (- 300) mg/dygn.

Doser över 50 mg/dygn ska delas upp i morgon- och kvällsdos.





Fluvoxamin oralt

(Fevarin) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Fevarin ingår inte i högkostnadsskyddet, kontrollerat 02/2026.

Icke farmakologisk behandling (ex strukturerad psykopedagogisk behandling) rekommenderas innan läkemedelsbehandling är aktuell.

Biverkningar av SSRI såsom hyperaktivitet, impulsivitet, rastlöshet, aggressivitet, störd sömn och självskador benämns ofta som aktivering. Biverkningarna är dosberoende, kommer tidigt vid dosökning och avklingar direkt vid dosreduktion eller utsättning. Det är den vanligaste orsaken till avbrott av behandlingen.

Risken är större vid lägre ålder, vid samtidiga ADHD-symtom och vid snabbare dostitrering samt högre doser av SSRI.

Interagerar med och ökar kraftigt nivåerna av klomipramin, fluoxetin, mirtazapin och melatonin, se Janusmed (klickbar i Referenser).

Tidpunkt för nedtrappning och utsättning anpassas utifrån den enskilda patientens livssituation för att minska risken för återinsjuknande. Liksom vid upptrappning rekommenderas att nedtrappningen sker stegvis under en längre tidsperiod. En stegvis nedtrappning över tid kan underlätta bedömningen om nytillkomna symtom ska förstås som utsättningsreaktioner eller återinsjuknande.



Fluvoxamin oralt

(Fevarin) tabletter



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Janusinfo Janusmed interaktioner

<https://janusmed.se/interaktioner>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna, 2025

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer?q=depression>=0>

PubMed PMID Hetrick SE et al. New generation antidepressants for depression in children and adolescents: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34029378>

PubMed PMID Stimpf JN et al. Deprescribing Antidepressants in Children and Adolescents: A Systematic Review of Discontinuation Approaches, Cross-Titration, and Withdrawal Symptoms. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2025

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39469761>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2024

<https://sif.se/sfbup/riktlinjer/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 5496

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-03-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT