



## Rivaroxaban oralt

(ex Xarelto) tabletter/kapslar

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 2,5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg (ex Xarelto)  
Kapslar 15 och 20 mg (Rivaroxaban STADA)

Rivaroxaban finns även som oral suspension 1 mg/mL, se annan instruktion.

### ADMINISTRERING

Administreras i samband med måltid.

Oralt: Tabletterna går att krossa och slamma upp i mjuk mat för lättare nedsväljning.  
Blandningen är hållbar i 4 tim.

Enteralt: Tabletterna går att krossa och slamma upp i vatten för administrering.  
Blandningen är hållbar i 4 tim.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Rivaroxaban (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor.

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid behov rekommenderas kontakt med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

Behandlingstiden anpassas individuellt baserat på indikation och behandlingssvar.

#### Venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE

Nyfödda (fullgångna\*, från 2,6 kg) - 18 år:

2,6 - 2,9 kg:	0,8 mg x 3
3 - 3,9 kg:	0,9 mg x 3
4 - 4,9 kg:	1,4 mg x 3
5 - 6,9 kg:	1,6 mg x 3
7 - 7,9 kg:	1,8 mg x 3
8 - 8,9 kg:	2,4 mg x 3
9 - 9,9 kg:	2,8 mg x 3
10 - 11,9 kg:	3 mg x 3
12 - 29,9 kg:	5 mg x 2
30 - 49,9 kg:	15 mg x 1
Över 50 kg:	20 mg x 1

\* Efter 10 dagars oral matning.

Behandling för barn under 15 år (under 50 kg) kan påbörjas efter minst fem dagars behandling med lågmolekylära hepariner.

#### Primär venös tromboembolism (VTE) profylax

Barn (från 7 kg) - 18 år:

7 - 7,9 kg:	1,1 mg x 2
8 - 9,9 kg:	1,6 mg x 2
10 - 11,9 kg:	1,7 mg x 2
12 - 19,9 kg:	2,0 mg x 2
20 - 29,9 kg:	2,5 mg x 2
30 - 49,9 kg:	7,5 mg x 1
Över 50 kg:	10 mg x 1





## Rivaroxaban oralt

(ex Xarelto) tabletter/kapslar

### ÖVRIG INFORMATION

Inför vissa kirurgiska ingrepp kan rivaroxaban behöva sättas ut ett par dagar innan ingrepp och ersättas med annan korttidsverkande antikoagulantia. Rivaroxaban kan återinsättas tidigast 4 - 6 timmar efter ingreppet.

Rivaroxaban är kontraindicerat vid måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion (GFR < 50 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>).

Antidot:

Aktivt kol inom 2 timmar efter administrering av rivaroxaban, se annan instruktion. Ocplex eller Confidex, se annan instruktion.





## Rivaroxaban oralt

(ex Xarelto) tablett/kapslar

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Brandão, L. R et al. (2025). SickKids handbook of pediatric thrombosis and hemostasis (3rd rev. and expanded ed.)

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

PubMed PMID Connor P. et al. Safety and efficacy of rivaroxaban in pediatric cerebral venous thrombosis (EINSTEIN-Jr CVT). Blood Adv. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33351120>

PubMed PMID Male C. et al. EINSTEIN-Jr Phase 3 Investigators. Rivaroxaban compared with standard anticoagulants for the treatment of acute venous thromboembolism in children: a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Haematol. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31699660>

PubMed PMID McCrindle BW. et al. UNIVERSE Study Investigators \*. Thromboprophylaxis for Children Post-Fontan Procedure: Insights From the UNIVERSE Study. J Am Heart Assoc. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34558312>

PubMed PMID Spiezia L. et al. Venous Thromboembolism in Children: The Rivaroxaban Experience. Semin Thromb Hemost. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38181816>

PubMed PMID Thom K. et al. Safety and efficacy of anticoagulant therapy in pediatric catheter-related venous thrombosis (EINSTEIN-Jr CVC-VTE). Blood Adv. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33002131>

PubMed PMID Willmann S. et al. Model-informed bridging of rivaroxaban doses for thromboprophylaxis in pediatric patients aged 9 years and older with congenital heart disease. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2022

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35665486>

PubMed PMID Young G. et al. EINSTEIN-Jr. Phase 3 Investigators. Rivaroxaban for treatment of pediatric venous thromboembolism. An Einstein-Jr phase 3 dose-exposure-response evaluation. J Thromb Haemost. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32246743>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>



## Rivaroxaban oralt

(ex Xarelto) tabletter/kapslar



Svenska Barnläkarföreningen Delförening för Pediatrik Hematologi och Onkologi -  
Trombos, lungemboli och sinustrombos

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vph-varoplaneringsgruppen-for-pediatrik-hematologi/wardprogram-vph/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Hanna Gottlieb

ePedID: 5502

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2026-03-31

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**