



Vaccin: Varilrix intramuskulär/subkutan inj mot vattkoppor

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Levande försvagat vaccin mot vattkoppor

EN-STEGSSPÄDNING

Varilrix		Medföljande vätska, förfylld spruta		IM INJ
	+		=	1 dos
1 inj flaska		1 st		0,5 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt hela volymen spädningsvätska i den förfyllda sprutan till flaskan med pulvret. Skaka försiktigt så att suspensionen blandas ordentligt. Dra sedan upp hela volymen i en spruta, byt nål och administrera vaccinet. Det färdiga vaccinet ska vara klart och persikofärgat till rosa. Vaccinet kan innehålla halvgenomskinliga partiklar, det är normalt och påverkar inte vaccinets effekt.

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion: vanligaste administreringsvägen

Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).
Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Subkutan injektion: rekommenderad administreringsväg för patienter med trombocytopeni eller koagulationssjukdom

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Varilrix (registrerad produkt)

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Förvaras i kylskåp i originalförpackningen, ljuskänsligt.

1 dos, Injektionsvätska, intramuskulär

Färdigberett vaccin bör administreras direkt, men är hållbart 8 tim i kylskåp eller 1,5 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot vattkoppor

Dos: 0,5 mL/dos

Barn 9 - 11 mån:

Två doser ges, den andra dosen ska ges tidigast 3 månader efter den första dosen.

Barn 1 - 18 år:

Två doser ges, den andra dosen ska helst ges minst 6 veckor efter den första dosen. Intervallet mellan doserna får aldrig understiga 4 veckor.

Barn med hög risk för allvarlig sjukdom kan behöva ytterligare doser efter tvådos-schemat. Intervallet mellan doserna får aldrig understiga 4 veckor.

ÖVRIG INFORMATION

De som är gravida, har allvarlig immunbrist, pågående immunsuppressiv behandling eller aktiv tuberkulos ska inte vaccineras mot vattkoppor. Vid infektion med hög feber bör vaccinationen skjutas upp. Om en patient fått immunglobulin ska det gå minst tre månader innan vaccination.

Varilrix kan även ges som postexpositionsprofylax till mottagliga personer som exponerats för vattkoppor. Vaccinering inom 3 dagar efter exponeringen ger vanligen ett mildare sjukdomsförlopp.

Varilrix är ett levande försvagat vaccin och kan ges samtidigt som ett eller flera inaktiverade vaccin. Samtidig administrering som andra levande försvagade parenterala vaccin går också bra, men helst ges dessa med minst 4 veckors mellanrum. Se även referens Janusinfo.

Vaccin mot vattkoppor införs i barnvaccinationsprogrammet 2027.



Vaccin: Varilrix intramuskulär/subkutan inj mot vattkoppor



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Folkhälsomyndigheten Vaccination mot vattkoppor

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/vara-amnesomraden/vaccinationer/vaccinationer-a-o/vaccination-mot-vattkoppor/>

Janusinfo Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén

ePedID: 5511

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-03-31

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT