



Barnläkemedelsgruppen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.  
Stockholm 2021, ePed©

## **Merkaptopurin tabletter och oral lösning**

Merkaptopurin används för att behandla vissa cancertyper genom att stoppa tillväxt och överlevnad av cancerceller.

Om du har frågor eller funderingar var god kontakta din behandlande mottagning.

### **Råd innan hantering av läkemedlet**

- Om du är gravid ska du undvika att komma i kontakt med merkaptopurin.
- Xaluprine oral suspension ska skakas i minst 30 sek vid första användningen. Nästkommande dostillfällen ska flaskan endast skakas i ca 5 sek.
- Med varje flaska Xaluprine oral suspension medföljer en adapter och två orala sprutor. Både adaptern och medföljande sprutor ska kastas och ersättas med en adapter och sprutor från avdelningen.
- Merkaptopurin tas med fördel vid sänggående. För vissa barn behöver läkemedlet tas på morgonen för att undvika lågt blodsocker.
- Merkaptopurin kan tas tillsammans med mat och mjölkprodukter eller på fastande mage. Se till att ge läkemedlet på samma sätt varje dag i förhållande till mat och dryck.
- Låt ditt barn dricka vätska i samband med samt efter intag av läkemedlet.

## Biverkningar

Ditt barn kan drabbas av biverkningar under behandling med merkaptopurin. Om nedanstående biverkningar blir värre, inte försvinner/inte blir bättre med tiden samt påverkar ditt barns allmäntillstånd kontakta din behandlande mottagning.

- Illamående
- Tappar hår
- Hudutslag
- Munsår
- Mild huvudvärk

## Kontakta läkaren eller sök akutvård

Om ditt barn får svårare biverkningar t.ex. feber, hosta, sveda när ditt barn kissar, blod i urinen, mörk avföring, svårt att andas, ont i bröstet eller andningssvårigheter kontakta din läkare omgående eller sök akutvård.

## Övrig viktig information

- Det är viktigt att barnet dricker ofta för att skydda njurarna.
- Berätta alltid för läkare/tandläkare att ditt barn står på merkaptopurin innan behandling/ingrepp.
- Ditt barn ska inte tatuera sig eller skaffa sig piercing (inklusive ta hål i öron) under pågående behandling för att minska blödningsrisken.
- Ditt barn ska inte vaccinera sig med levande vacciner t ex poliovaccin under pågående behandling. Kontakta din behandlande mottagning vid frågor och funderingar.
- Rådgör alltid med behandlande läkare innan ditt barn tar andra läkemedel än de som läkaren har ordinerat.

### **Sår och blåsor i munnen/läppar**

Det är viktigt med god munhygien, borsta barnets tänder morgon och kväll. Kontakta din behandlande mottagning om barnet får munsår eller blåsor eller klagar på smärta vid måltider.

### **Hållbarhet**

Xaluprine® oral lösning är hållbar 56 dagar i rumstemperatur efter öppnandet.