



Ranaa Akkawi El Edelbi, Barnläkemedelsgruppen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Stockholm 2021, ePed©

Metotrexat tabletter

Metotrexat används för att behandla vissa cancertyper genom att stoppa tillväxt och överlevnad av cancerceller.

Om du har övriga frågor eller funderingar var god kontakta din behandlande mottagning.

Råd innan hantering av läkemedlet

- Om du är gravid ska du undvika att komma i kontakt med metotrexat.
- Metotrexat bör tas på tom mage EN gång/VECKA (1 timme före eller 2 timmar efter mat) i samband med sänggående om möjligt. Om ditt barn har en känslig mage kan läkemedlet ges med mat.

Biverkningar

Ditt barn kan drabbas av biverkningar under behandling med metotrexat. Om nedanstående biverkningar blir värre, inte försvinner/inte blir bättre med tiden samt påverkar ditt barns allmäntillstånd kontakta din behandlande mottagning.

- Illamående
- Hudutslag
- Munsår
- Mild huvudvärk

Kontakta läkaren eller sök akutvård

Om ditt barn får svårare biverkningar t ex feber, hosta, sveda när ditt barn kissar, blod i urinen, mörk avföring, svårt att andas, ont i bröstet eller andningssvårigheter kontakta läkaren omgående eller sök akutvård.

Övrig viktig information

- Berätta alltid för läkare/tandläkare att ditt barn står på metotrexat innan behandling/ingrepp.
- Ditt barn ska inte tatuera sig eller skaffa sig piercing (inklusive ta hål i öronen) under pågående behandling då dessa ingrepp ökar blödningsrisken.
- Ditt barn ska inte vaccinera sig med levande vacciner t ex poliovaccin under pågående behandling. Kontakta behandlande läkare vid frågor och funderingar.
- Rådgör alltid med behandlande läkare innan ditt barn tar andra läkemedel än de som läkaren har ordinerat.

Sår och blåsor i munnen/läppar

Det är viktigt med god munhygien, tänderna ska borstas morgon och kväll. Kontakta din behandlande mottagning om barnet får munsår eller blåsor eller klagar på smärta vid måltider.