

# Hur gör man för att inte glömma att ta bort ett medicinskt plåster?

- Du har satt ett EMLA plåster (eller motsvarande) på ett barn. På vilka sätt kan du försäkra dig om att det tas av i tid?
- Hur lång tid rekommenderas ett EMLA plåster sitta på ett barn?
  - Under 1 år
  - Under 6 år



L.A. Times/Washington Post

# ...det finns flera sätt att öka möjligheten att ett medicinskt plåster tas bort i tid

- Förslag att diskutera vad ni använder för strategier på er enhet.
  - Ge information till föräldrar vid applicering när plåstret ska plockas bort.
  - Hantering av plåster bör ingå i överrapportering (SBAR) mellan vårdenheter, både muntligt och via checklista.
  - Dokumentera applicering av medicinskt plåster i läkemedelsjournal.
  - Eventuellt använd uppmärksamhetssymbol på patienten typ klisterlapp eller armband.
- Hur lång tid rekommenderas ett EMLA plåster sitta på ett barn
  - Under 1 år – max 1 timme
  - Under 6 år – max 5 timmar



L.A. Times/Washington Post



Läs mer:

[https://eped.se/backup/eped/bestpractices/show\\_bestpractice\\_E02BP00106.html](https://eped.se/backup/eped/bestpractices/show_bestpractice_E02BP00106.html)

**LM**  
SÄKERHET  
#106



1 min



eped.se