

Har du någonsin blivit störd vid iordningställande av läkemedel?

- Hur gör du för att få arbeta ostört?
 - Hur kan du undvika misstag som rör avbrott i läkemedelshanteringen?
- Vilka moment kan vara extra riskfyllda för avbrott?



Arbeta för en kultur på avdelningen där man kan arbeta ostört.

- Det finns signaler och metoder ni kan använda på er enhet:
 - Tänk att det är alltid en risk att bli störd. Odla en kultur där man inte stör vid iordningställande.
 - Användandet av uppmärksamhetsymboler ex. "stör ej".
 - Upprätta tysta zoner och påminna kollegor.
 - Svara inte i telefon vid kritiska moment.
 - Jobba systematiskt så du vet vilka läkemedel som tillsats (flytta från en sida till en annan, märk det som är färdigt)

Om du blir avbruten:

- Avbryt uppgiften vid ett lämpligt tillfälle. Märk det du gjort.
 - Om du är osäker. Börja om med uppgiften.
- Exempel på extra riskfyllda tillfällen:
 - ...vid spädning i flera steg
 - ...vid kontroll av dosens rimlighet
 - ...vid iordningställande av flera olika läkemedel eller till flera olika patienter samtidigt



Läs mer:

https://eped.se/backup/eped/bestpractices/show_bestpractice_I01BP00057.html

LM
SÄKERHET
#57



1 min



eped.se